

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → แรเตกราเวียร์

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html>

## แรเตกราเวียร์

ออกเสียงว่า (ral teg 'ra veer)

### hy เป็นยานี้กำหนด?

Raltegravir ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 4.5 ปอนด์ (2 กก.) Raltegravir อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า HIV integrase inhibitors มันทำงานโดยการลดปริมาณของเอชไอวีในเลือด แม้ว่า raltegravir ไม่สามารถรักษา HIV ได้ แต่ก็อาจลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ที่ได้มาและโรคที่เกี่ยวข้องกับ HIV เช่นการติดเชื้อร้ายแรงหรือมะเร็ง การใช้ยานี้เหล่านี้อาจนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตอื่นๆ อาจลดความเสี่ยงในการแพร่ (แพร่) ไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อื่น

### ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Raltegravir มาในรูปแบบยาเม็ด เม็ดเคี้ยว และเป็นเม็ดสำหรับแขวนลอยทางปากเพื่อใช้ทางปาก รaltegravir (Isentress®) ยาเม็ด เม็ดเคี้ยว และสารแขวนลอยในช่องปาก มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละสองครั้ง รaltegravir (Isentress®HD) มักรับประทานยาเม็ดโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ทาน raltegravir ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ raltegravir ตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ หากคุณกำลังรับประทานยาเม็ดเคี้ยว คุณอาจเคี้ยวหรือกลืนทั้งเม็ด

สำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเคี้ยว เม็ดเคี้ยวอาจบดและผสมกับของเหลว 1 ช้อนชา (5 มล.) เช่น น้ำ น้ำผลไม้ หรือนมแม่ในถ้วยที่สะอาด เม็ดจะดูดซับของเหลวและกระจายภายใน 2 นาที ใช้ช้อนบดเม็ดยาที่เหลือ ตีส่วนผสมทันที หากมียาเหลืออยู่ในถ้วย ให้เติมของเหลวอีกช้อนชา (5 มล.) หมุนวนแล้วนำยาทันที

ก่อนที่คุณจะใช้ raltegravir oral suspension เป็นครั้งแรก ให้อ่านคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับยานี้ซึ่งอธิบายวิธีเตรียมยา เทเนื้อหาของซองแบบเม็ดเดียวลงในถ้วยผสมและเติมน้ำ 2 ช้อนชา (10 มล.) ค่อยๆ หมุนเนื้อหาในถ้วยผสมเป็นเวลา 45 วินาที อย่าเขย่า ใช้กระบอกฉีดยาที่ให้มีเพื่อวัดปริมาณยาที่แพทย์สั่ง ใช้ส่วนผสมภายใน 30 นาทีของการเตรียมการและทิ้งสารแขวนลอยที่เหลืออยู่

การรอลเตกราเวียร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานรอลเตกราเวียร์หรือยาต้านเอชไอวีอื่นๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดการรอลเตกราเวียร์หรือข้ามขนาดยา อาการของคุณอาจแย่ลงและไวรัสอาจต้องการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอคำแนะนำข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

## ใช้สำหรับยา

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวด ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนรับประทานรอลเตกราเวียร์

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยารอลเตกราเวียร์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในผลิตภัณฑ์รอลเตกราเวียร์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาลดกรดที่มีแคลเซียม แมกนีเซียม หรืออะลูมิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ); carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); ยาลดคอเลสเตอรอล (สแตติน) เช่น atorvastatin (Lipitor ใน Caduet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) และ simvastatin (Zocor ใน Vytorin); etravirine (สติปัญญา); fenofibrate (Antara, Lipofen, Tricor, อื่น ๆ ); เจมโฟโบรซิล (โลปด); ฟีนอบาร์บิทัล; ฟีนโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไอแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater), tipranavir (Aptivus) กับ ritonavir (Norvir); และ zidovudine (Retrovir, อื่นๆ)
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต (การรักษาทางการแพทย์เพื่อล้างเลือดเมื่อไตทำงานไม่ถูกต้อง) หรือหากเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือไตรกลีเซอไรด์ (สารที่มีไขมันในเลือด) โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หรือบวมของกล้ามเนื้อ หรือ rhabdomyolysis (ภาวะกล้ามเนื้อโครงร่าง)
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานรอลเตกราเวียร์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ บอกแพทย์หากคุณกำลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกหากคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือถ้าคุณกำลังใช้ยาเรลเตกราเวียร์
- หากคุณมีฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU ซึ่งเป็นภาวะที่สืบทอดมาซึ่งต้องปฏิบัติตามอาหารพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองของคุณที่อาจทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง) คุณควรรู้ว่ายาเม็ดที่เคี้ยวได้นั้นมีสารให้ความหวานที่ก่อให้เกิดฟีนิลอะลานีน
- คุณควรรู้ว่าในขณะที่คุณใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้น และเริ่มต่อสู้กับการติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแล้ว นี่อาจทำให้คุณมีอาการของการติดเชื้อเหล่านั้น หากมีอาการใหม่หรืออาการแย่ลงระหว่างการรักษาด้วย raltegravir

## จันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวดหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

## จันควรทำอย่างไรถ้าจันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับบันทึกที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ raltegravir สองเม็ดพร้อมกันเพื่อชดเชยยาที่ไม่ได้รับ

## ผลข้างเคียงของหมวด ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

**Raltegravir อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:**

- ท้องเสีย
- แก๊ส
- อาการปวดท้อง
- อิจฉาริษยา
- นอนไม่หลับ
- ความฝันที่ผิดปกติ
- ภาวะซึมเศร้า
- ปวดหัว

**ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษายาบาลฉุกเฉิน:**

- ปวดกล้ามเนื้อหรือความอ่อนโยน
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปัสสาวะสีเข้มหรือสีโคล่า
- อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน
- ผื่น
- ไข้
- แผลพุพองหรือลอกออก
- ลมพิษ
- อาการคัน
- อาการบวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ มือ เท้า ข้อเท้า หรือแขน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- เหนื่อยมาก
- แผลในปาก
- ตาแดง คันหรือบวม
- ปวดท้องด้านขวาบน
- สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
- อุจจาระสีซีด

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- เบื่ออาหาร
- หัวใจเต้นเร็ว
- หายใจถี่
- มีไข้ เจ็บคอ ไอ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ
- ขาดพลังงาน
- น้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ปริมาณปัสสาวะลดลง
- บวมที่เท้า ข้อมือ หรือขา
- อาการง่วงนอน

Raltegravir อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

## หมวก จันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ) อย่าเอาสารดูดความชื้น (ห่อเล็ก ๆ ที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตเพื่อดูดซับความชื้น) ออกจากขวดของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อกฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานีลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่จันควรรู้?

เก็บการนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณในขณะที่ใช้ raltegravir แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ raltegravir

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- ไอเซนเกรส®
- ไอเซนเกรส®HD

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ  
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022