

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Raltegravir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html>

Raltegravir

pronunciado como (ral teg' ra veer)

por que este medicamento é prescrito?

O raltegravir é usado junto com outros medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em adultos e crianças que pesam pelo menos 2 kg. O raltegravir está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da integrase do HIV. Funciona diminuindo a quantidade de HIV no sangue. Embora o raltegravir não cure o HIV, ele pode diminuir a chance de desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer. Tomar esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de transmissão (disseminação) do vírus HIV para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

O raltegravir apresenta-se na forma de comprimido, comprimido mastigável e grânulos para suspensão oral para tomar por via oral. Raltegravir (Isentress®), comprimidos mastigáveis e suspensão oral são geralmente tomados com ou sem alimentos duas vezes ao dia. Raltegravir (Isentress®HD) são geralmente tomados com ou sem alimentos uma vez por dia. Tome raltegravir à(s) mesma(s) hora(s) todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome raltegravir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue ou esmague. Se estiver a tomar os comprimidos mastigáveis, pode mastigá-los ou engoli-los inteiros.

Para crianças com dificuldade para mastigar, os comprimidos mastigáveis podem ser esmagados e misturados com 1 colher de chá (5 mL) de líquido como água, suco ou leite materno em um copo limpo. Os comprimidos absorverão o líquido e se desfarão em 2 minutos. Usando uma colher, esmague os pedaços restantes dos comprimidos. Beba a mistura imediatamente. Se sobrar algum medicamento no copo, adicione outra colher de chá (5 mL) de líquido, agite e tome imediatamente.

Antes de tomar raltegravir suspensão oral pela primeira vez, leia as instruções escritas que o acompanham que descrevem como preparar o medicamento. Esvazie o conteúdo de um pacote de grânulos no copo misturador e adicione 2 colheres de chá (10 mL) de água. Agite suavemente o conteúdo no copo de mistura por 45 segundos; não agite. Use a seringa de dosagem fornecida para medir a quantidade de medicamento que seu médico receitou. Use a mistura dentro de 30 minutos após a preparação e descarte qualquer suspensão restante.

Continue a tomar raltegravir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar raltegravir ou outros medicamentos anti-HIV sem falar com seu médico. Se você parar de tomar raltegravir ou pular doses, sua condição pode piorar e o vírus pode se tornar resistente ao tratamento.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar raltegravir,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao raltegravir, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos produtos com raltegravir. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: antiácidos contendo cálcio, magnésio ou alumínio (Maalox, Mylanta, Tums, outros); carbamazepina (Equetro, Tegretol, Teril); medicamentos para baixar o colesterol (estatinas), como atorvastatina (Lipitor, em Caduet), fluvastatina (Lescol), lovastatina (Altoprev), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina (Crestor) e sinvastatina (Zocor, em Vytorin); etravirina (Intelence); fenofibrato (Antara, Lipofen, Tricor, outros); gemfibrozil (Lopid); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater), tipranavir (Aptivus) com ritonavir (Norvir); e zidovudina (Retrovir, outros).
- informe o seu médico se estiver a ser tratado com diálise (tratamento médico para limpar o sangue quando os rins não estão a funcionar adequadamente), ou se tem ou já teve hepatite, colesterol elevado ou triglicéridos (substâncias gordas no sangue), doença muscular ou inchaço dos músculos, ou rabdomiólise (uma condição do músculo esquelético).
- informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se engravidar enquanto estiver a tomar raltegravir, contacte o seu médico. Informe o seu médico se estiver a amamentar ou planeia amamentar. Você não deve amamentar se estiver infectada pelo HIV ou se estiver tomando raltegravir.
- se você tem fenilcetonúria (PKU, uma condição hereditária na qual uma dieta especial deve ser seguida para evitar danos ao cérebro que podem causar deficiência intelectual grave), você deve saber que os comprimidos mastigáveis contêm aspartame que forma fenilalanina.
- você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo. Isso pode fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções. Se tiver sintomas novos ou agravados durante o tratamento com raltegravir.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome dois comprimidos de raltegravir ao mesmo tempo para compensar uma dose esquecida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O raltegravir pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- diarreia
- gás
- dor de estômago
- azia
- insônia
- sonhos anormais
- depressão
- dor de cabeça

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- dor muscular ou sensibilidade
- fraqueza muscular
- urina escura ou cor de cola
- dor ou pressão no peito
- irritação na pele
- febre
- bolhas na pele ou descamação
- urticária
- coceira
- inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta, mãos, pés, tornozelos ou braços
- dificuldade em respirar ou engolir
- Cansaço extremo
- lesões na boca
- olhos vermelhos, com coceira ou inchados
- dor na parte superior direita do estômago
- amarelecimento da pele ou dos olhos
- fezes claras

- náusea
- vômito
- perda de apetite
- batimento cardíaco rápido
- falta de ar
- febre, dor de garganta, tosse, calafrios e outros sinais de infecção
- falta de energia
- ganho de peso inexplicável
- diminuição da quantidade de urina
- inchaço ao redor dos pés, tornozelos ou pernas
- sonolência

O raltegravir pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Não remova o dessecante (pequeno pacote incluído com os comprimidos para absorver a umidade) do seu frasco.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com seu médico e laboratório enquanto estiver tomando raltegravir. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo ao raltegravir.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Isentress®
- Isentress®HD

Última revisão - 15/01/2022

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022