



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Nelfinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html>

nelfinavir

(nel fin' a veer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Nelfinavir, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Nelfinavir, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışır. Nelfinavir HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer insanlara bulaşma riskini azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Nelfinavir, ağızdan alınacak bir tablet ve toz halinde gelir. Genellikle yemekle birlikte günde iki ila üç kez alınır. Nelfinavir'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Nelfinavir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tableti yutamıyorsanız, bir bardağa koyup az miktarda suda eritebilirsiniz. Sıvıyı iyice karıştırın ve hemen için. Bardağı daha fazla suyla çalkalayın ve tüm ilacı aldığınızdan emin olmak için karışımın tamamını yutun.

Nelfinavir oral toz su, süt, formül mama, soya sütü veya diyet takviyelerine eklenebilir. İyice karıştırın ve tam dozu almak için hemen tüm sıvıyı için. Reçete etiketiniz, sıvıya kaç kaşık nelfinavir tozu ekleyeceğinizi söyler. Karışım hemen alınmayacaksa buzdolabında saklanmalı ve 6 saat içinde alınmalıdır. Nelfinavir oral tozunu asitli yiyecek veya meyve suyu (portakal suyu, elma suyu veya elma sosu) ile karıştırmayın. Nelfinavir'i orijinal kabında suyla karıştırmayın.

Nelfinavir HIV enfeksiyonunu kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile nelfinavir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan nelfinavir almayı bırakmayınız. Nelfinavir almayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız enfeksiyonunuz kötüleşebilir veya ilaçlara dirençli hale gelebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Nelfinavir almadan önce,

- nelfinavir'e, diğer ilaçlara veya nelfinavir tabletleri veya tozundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- alfuzosin (Üroksatral) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; amiodaron (Cordarone, Nexterone, Pacerone); sisaprid (Propulsid; ABD'de mevcut değildir); bromokriptin (Cycloset, Parlodel), dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloid mesilatlar (Hydergine), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta) ve metilergonovin (Methergine) gibi ergot tipi ilaçlar; lovastatin (Altoprev); lurasidon (Latuda); ağız yoluyla midazolam (Versed); pimozid (Orap); kinidin (Nuedexta'da); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de, Rifamate'de); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); Sarı Kantaron; ve triazolam (Halcion). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen nelfinavir almamanızı söyleyecektir.
- doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); azitromisin (Azasite, Zithromax, Zmax); bosentan (Tracleer); amlodipin (Norvasc, Prestalia'da, Twynsta'da, diğerleri), felodipin, isradipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipin (Nymalize) ve nisoldipin (Sular) gibi bazı kalsiyum kanalı bloke edici ilaçlar; karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, diğerleri); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) ve rosuvastatin (Crestor) gibi bazı kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); kolşisin (Colcrys, Mitigare); delavirdin (Rescriptor); flutikazon (Flonaz, Flovent; Advair'de); indinavir (Crixivan); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) ve takrolimus (Astagraf XL, Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar; metadon (Dolophine, Metadose); nevirapin (Viramune); sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) ve vardenafil (Levitra) gibi erektil disfonksiyon için kullanılan bazı fosfodiesteraz inhibitörleri (PDE-5 inhibitörleri); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) ve rabeprazol (AcipHex) gibi proton pompası inhibitörleri; ketiapiin (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Viekira Pak'ta); salmeterol (Serevent, Advair'de); sakonavir (Invirase); ve trazodon. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da nelfinavir ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Didanosin (Videx) alıyorsanız, nelfinavirden 1 saat önce veya 2 saatten fazla bir süre sonra alınız.
- doğum kontrol hapi alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Nelfinavir oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Bu ilacı alırken başka bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Nelfinavir alırken doğum kontrolü hakkında doktorunuzla konuşun.
- doktorunuza diyabet, hemofili (kanın pıhtılaşma yeteneğinin normal olmadığı bir grup kalıtsal kanama bozukluğu) veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Nelfinavir kullanırken hamile kalırsanız doktorunuza arayın. HIV enfeksiyonunuz varsa ve nelfinavir alıyorsanız emzirmemelisiniz.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye nelfinavir kullandığınızı söyleyin.

- vücut yağınızın artabileceğini veya sırtınızın üst kısmı, boynunuz ('buffalo kambur'), göğüsleriniz ve midenizin çevresi gibi vücudunuzun farklı bölgelerine hareket edebileceğinin farkında olmalısınız. Yüzünüzden, bacaklarınızdan ve kollarınızdan vücut yağ kaybını fark edebilirsiniz.
- Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Nelfinavir kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkar çıkmaz doktorunuzu aramanız çok önemlidir, çünkü tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen ciddi bir duruma neden olabilir. Ketoasidoz erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ketoasidozun belirtileri arasında ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, nefes darlığı, meyve kokulu nefes ve bilinç azalması sayılabilir.
- Fenilketonüri (PKU, beyninizde ciddi zihinsel engelliliğe neden olabilecek hasarı önlemek için özel bir diyetin izlenmesi gereken kalıtsal bir durum) varsa, nelfinavir oral tozunun fenilalanin oluşturan aspartam ile tatlandırıldığını bilmelisiniz.
- HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Nelfinavir ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda yeni veya kötüleşen semptomlar yaşarsanız, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Nelfinavir yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- ishal
- mide bulantısı
- gaz
- karın ağrısı
- iştah kaybı
- döküntü

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- kurdeşen
- kaşıntı
- nefes alma veya yutma zorluğu

Nelfinavir, laboratuvar hayvanlarında kansere neden olduğu tespit edilen bir kimyasal içerir. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), üreticiden nelfinavir ürünlerindeki bu kimyasalın miktarını azaltmak için nelfinavir'in yapılış biçiminde değişiklik yapmasını istedi. İnsanlar için risk bilinmemektedir ancak çocuklarda ve hamile kadınlarda daha yüksek olabilir. Nelfinavir almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptaki sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Nelfinavir tozu sıvıya eklendikten sonra karışım oda sıcaklığında 6 saate kadar saklanabilir.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz nelfinavir'e cevabınızı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Elinizde bir miktar nelfinavir bulundurun. Reçetenizi tekrar doldurmak için ilaçlarınızın bitmesini beklemeyin.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.

takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Viracept®

Son Revize - 01/15/2022

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022